

Allmän/respiratorisk/cirkulations påverkan



Uteslut Vasovagal reaktion och Primär hyperventilation



Obstruktiv - sitta upp. Annars ligga. Ge syrgas



Adrenalin 1 mg/ml i.m  
0,01 ml/kg max 0,5 ml  
eller Adrenalinpenna  
<20 kg: 150µg  
≥20 kg: 300µg



Vid bronkobstruktion inhalation  
2-6 doser egen bronkvidgare  
alt. Ventoline 5 mg/ml i Ailos eller Maxin enligt PM



Vid hypotension eller allmänpåverkan  
Ringer-Acetat el NaCl 9mg/ml, 10 ml/kg



Upprepa adrenalin vb  
Upprepa inhalation vb  
Upprepa Ringer-Acetat el NaCl 9mg/ml vb



Antihistamin po  
Tabl Caredin munlöslig 2,5/5 mg  
<6 år: 2,5 mg  
6-12 år: 5 mg  
>12 år: 10 mg



Kortison po eller iv  
Tabl Betapred 0,5 mg  
<6 år: 6 st  
≥6 år: 10 st  
eller  
Inj Betapred 4 mg/ml iv  
<6 år: 1 ml  
≥6 år: 2 ml  
eller  
Inj Solu-Cortef 50 mg/ml iv  
<6 år: 2 ml  
≥6 år: 4 ml