

| Klass | Namn (substans) | Start-dos | Maxdos vid GFR >60 | Maxdos vid GFR 45–59 | Maxdos vid GFR 30–44 | Vid GFR <30 | HbA1c reduc | Hypo risk | + | - | Kostnad dag (kr) |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|--|--|-------------|-----------|--|--|---|
| Biguanid | Metformin | 500mg | 1gx2-(3) Successiv dosökning för att undvika GI-biverkningar | 1gx2 Mät eGFR var 3-4:e månad | 500mgx2 Mät eGFR var 3-4:e månad | Ges ej | 10–20 | nej | Hjärt-kärl+ njurprotektiv | Laktacidosis* Magbesvär | 1,10 (2g) |
| SGLT2 + biguanid | Synjardy (empagliflozin + metformin) | Se s. 48 | 12,5mg/1000mg 1x1 | 12,5mg/1000mg 1x1 | 12,5mg/1000mg 1x1 OBS! Maxdos metformin 1000mg/dygn | Ges ej | 5–13 | nej | Hjärt-kärl/ njur/hjärtsvikt-protektiv Viktne gång Minskad hjärtsvikt | Svampinfektion i underlivet UVI Magbesvär Laktacidosis* Ketoacidosis** | 8,20 (12,5mg/1000mg) |
| SGLT2-hämmare | Jardiance (empagliflozin) | 10mg | 25mg 1x1 | 25mg 0,5x1 SIC | 25mg 0,5x1 SIC | 25mg 0,5x1 SIC initieras ej vid GFR <20 | 5–13 | nej | Hjärt-kärl/ njur/hjärtsvikt-protektiv Viktne gång Minskad hjärtsvikt | Svampinfektion i underlivet UVI Ketoacidosis** | 14 (10mg) 16,40 (25mg) |
| | Forxiga (dapagliflozin) | 10mg | 10mg 1x1 | 10mg 1x1 | 10mg 1x1 | 10mg 1x1 initieras ej vid GFR <25 | 5–13 | nej | | | 14 (10mg) |
| GLP1-analog | Ozempic (semaglutid) | 0,25mg/vecka | 1mg/v | 1mg/v | 1mg/v | Ges ej <15 | 5–19 | nej | 1 gång/v Hjärt-kärlprotektiv Viktne gång | Spruta Illamående | 37,20 (oavsett dos) |
| | Trulicity (dulaglutid) | 1,5mg/vecka | 4,5mg/v | 4,5mg/v | 4,5mg/v | Ges ej <15 | 5–19 | nej | | | 37,20 (oavsett dos) |
| | Victoza (liraglutid) | 0,6mg i 1 vecka | 1,8mg 1x1 | 1,8mg 1x1 | 1,8mg 1x1 | Ges ej <15 | 5–19 | nej | Hjärt-kärlprotektiv (1,8mg dosen) Viktne gång | | 33,4 (1,2mg) 50 (1,8mg) |
| DPP4-hämmare | Januvia (sitagliptin) | 100mg | 100mg 1x1 | 100mg 1x1 | 50mg 1x1 | 25mg 1x1 | 5–8 | nej | Lite biverkningar Ej viktuppgång | Liten effekt | 1,50 (100mg) |
| | Trajenta (linagliptin) | 5mg | 5mg 1x1 | 5mg 1x1 | 5mg 1x1 | 5mg 1x1 | 5–8 | nej | | | 11,90 (5mg) |
| Glitazon | Pioglitazon | 30mg | 45mg 1x1 | 45mg 1x1 | 45mg 1x1 | Ges ej vid dialys | 10–15 | nej | Kärlprotektiv Motverkar leversteatos | Viktuppgång Ej vid hjärt-svikt/ maculaödem Försiktighet vid insulin Frakturrisk Urinblåsecancer? | 3,90 (15mg) 3,85 (30mg) 3,60 (45mg) |
| Glinid | Repaglinid | 0,5-1mg | 4mg 1x4 | 4mg 1x4 | 4mg 1x4 | 4mg 1x4 | 10–15 | viss | | Viktuppgång Hypoglykemirisk | 1,75 (4mg) |
| SU | Glimepirid | 1mg | 4(6) mg 1x1 | 4mg 1x1 | 4mg 1x1 | Ges ej | 10–20 | viss | Låg beh.kostnad | | 1,70 (2mg) |

* Kontraindicerat vid svår kronisk sjukdom (ex.vis respiratorisk insufficiens, instabil hjärtsvikt). Gör uppehåll vid akut svår sjukdom, uttorkningsrisk och inför röntgen med kontrast. Se under Kontraindikationer resp Varning och försiktighet i FASS för detaljer. Länk till vårdpraxis [Metforminbehandling-patientinformation](#)

** Gör uppehåll vid akut svår sjukdom, febril infektion, undernäring, uttorkning eller fasta samt 3 dagar innan operation (1–2 veckor innan obesitaskirurgi). Länk till vårdpraxis -[SGLT2-hämmare patientinformation](#)